




CLÍNICA
LAS AMAPOLAS

UNIDAD DE ENDOSCOPIA





Colonoscopia/Rectoscopia

Indicaciones:

- Debe traer orden médica, cédula de identidad.
- Debe presentarse 45 minutos antes de la hora agendada en el segundo piso, admisión de endoscopia para realizar trámites administrativos.
- Debe asistir con ropa cómoda, calzado bajo (sin tacos), sin joyas, uñas sin esmalte.
- Es aconsejable mantener los medicamentos habituales si son por tratamiento crónico. Puede tomarlos en casa con un poco de agua. Traer el nombre de sus medicamentos anotados.
- Debe venir acompañado por un adulto responsable, mayor de edad.
- El paciente no puede conducir después del procedimiento.
- Presentarse con resultados de exámenes de endoscopias y/o colonoscopias anteriores, en caso las tuviere. Si es operado de colonostomía, debe informarlo.
- Traer examen PCR Negativo (máximo 2-3 días antes)
- Valores: **Colonoscopia: \$200.000 / Rectoscopia: \$85.000** NOTA: si se toma BIOPSIA es un valor adicional.
- Para que su examen pueda realizarse de forma exitosa, le pedimos su colaboración en seguir cada indicación descrita en este documento.
- Todo el proceso del examen tiene una duración de 1 hora aproximadamente.



Colonoscopia/Rectoscopia

Preparación General:

- Una semana antes del examen suspender el consumo de alimentos con pepas como la uva, kiwi y chía.
- Suspender el consumo de legumbres y maíz.
- Suspender ASPIRINA 7 días antes del examen.
- Paciente con tratamiento con anemia, suspenderlo.
- Paciente Hipertenso tomar sus medicamentos en forma habitual con un poco de agua.
- NO tomar GLIBENCLAMIDA, METFORMINA u otros Hipoglicemiantes orales ni administrar Insulina, el día anterior ni el día del procedimiento.
- Suspender NEOSINTRÓN o HEPARINA 3 días antes del examen. (Consultar con su médico tratante algún reemplazo).





Colonoscopia

Preparación Específica:

72 HORAS
ANTES

- **NO DEBE CONSUMIR:**

Lácteos y sus derivados (leche, yogurt, flan, queso, etc)
Frutas, verduras crudas o cocidas, incluida palta y mermeladas. Alimentos de colores rojos, que puedan provocar cambios en la coloración del intestino (carnes rojas, betarraga, vino, etc).

- **PUEDE CONSUMIR SOLO:**

Abundante Líquido (2litros de agua) sin gas ni colorante.
Almuerzo: arroz o tallarines blancos, jalea de piña o limón.

24 HORAS
ANTES

- **SÓLO DEBE CONSUMIR DURANTE TODO EL DÍA:**

*Jalea de piña o limón

*Agua de hierbas, agua de la llave, agua mineral sin gas (1 o 2 litros durante el día).

*A las 16 hrs. Tomar el primer frasco de FLEET FOSFOSODA ORAL mezclado en una taza de agua fría.

*Continuar tomando agua al menos 10 vasos en 4 horas.

*A las 20 hrs. tomar segundo frasco de FLETT FOSFOSODA ORAL mezclado en una taza de agua fría.

*Continuar tomando líquidos a tolerancia.

EL DÍA DEL
EXAMEN

- **AYUNO TOTAL**

- No consumir ningún líquido posterior a la ingesta del laxante elegido.

- Se espera que tenga deposiciones líquidas amarillas, parecidas a la orina. Es normal

